

Provtagningsanvisning sårsekret, odling - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Allmän aerob och anaerob odling

Remiss	Remiss: Elektronisk remiss från Soarian, PMO/LabCenter eller LabPortalen (Reservrutin pappersremiss, Remiss 2 Mikrobiologi Laboratoriemedicin Region Gävleborg) Anamnes: Fyra faktorer är viktigt att få med på remissen: - Typ av sår och omfattning/allvarlighetsgrad (<i>exempelvis eksem, impetigo, venösa bensår, arteriella sår, trycksår, brännsår, postoperativt, peroperativt, fistel, djurbett</i>) - Sårets lokalisering - Patientens allmäntillstånd och underliggande sjukdomar - Eventuell antibiotikabehandling (avslutad, pågående eller planerad med preparatnamn). Finns någon antibiotikaallergi? Information kring dessa fyra faktorer är av yttersta vikt för att en korrekt bedömning av provet ska kunna ske. Vid misstanke om actinomykos, nocardios, brucellos, tularemi eller melioidos ska detta alltid framgå på remissen.
Provtagning	Provtagningsmaterial: Provtagningspinne CP480CE regular E-Swab rosa: artikelnr: 201515 Provtagningspinne CP483CE Uretra E-Swab orange: artikelnr: 201514 Provtagningspinne CP482CE nasopharynx E-Swab blå: artikelnr: 201520 Utförande: Före provtagningen tas eventuella krustor, beläggning och nekrotiskt material bort. Tvätta såret noga med steril kompress och koksalt. Roterat provtagningspinne i ett område med aktiv inflammation, dvs. sårkanten eller sårbotten. Undvik att bara samla upp pus som oftast innehåller små

	mängder levande bakterier. Om såret är torrt bör provtagningspinnen fuktas med koksalt.
Förvaring/transport	Förvaras kylt i väntan på transport
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk Mikrobiologi Gävle sjukhus
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Slutsvar vanligen inom 2-4 vardagar.
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/Övrig upplysning	Sårinfektioner hos i övrigt friska patienter orsakas oftast av S. aureus och betahemolyserande streptokocker. Vid nedsatt immunförsvar eller allvarligare infektioner kan även lågvirulenta bakterier orsaka infektion. Bakteriefloren i sår kan vara komplex och bedömning sker med hjälp av remissuppgifter. Potentiellt patogena bakterier art- och resistensbestäms. Resistensbestämning är ingen uppmaning till behandling. Gramnegativa tarmbakterier och Enterokocker är vanliga kolonisatörer i sår nedanför midjan och behandlas normalt ej med antibiotika.
Medicinsk bakgrund/indikation	Misstanke om bakteriell infektion.

Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2023-09-25	7	Tydligare beskrivning vad som ska anges på remissen och hur provtagningen bör utföras.