

Provtagningsanvisning anti-Transglutaminas IgA i serum - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller pappersremiss 3 serologi Region Gävleborg
Provtagning	5 mL, gul propp eller röd propp  För kapillärprov krävs minst 300 µL blod i mikrotainerrör
Förvaring/Transport	Hållbarhet 1 vecka i kylskåp Frys prov i -20°C vid längre förvaring
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Gävle
Referensintervall	< 7,0 kU/L
Svarstid	Helgfri måndag–fredag Analysen utförs 3 gånger/vecka.
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	I undantagsfall
Patientinformation	Ej tillämplig
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/Övrig upplysning	Ej tillämplig
Medicinsk bakgrund/indikation	Celiaki är ett kroniskt tillstånd där intag av gluten leder till kronisk inflammation och skador på tunntarmsslemhinnan. Vävnadstransglutaminas (tTG) är det viktigaste autoantigenet vid sjukdomen. Mätning av IgA-antikroppar mot vävnadstransglutaminas är en specifik markör för celiaki och

Medicinsk bakgrund/ indikation	dermatitis herpetiformis på personer > 3 år. Vid misstanke om IgA-brist analyseras automatiskt totalt IgA.
-----------------------------------	--

Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2023-07-18	9	Lagt till revideringstabell och ändrat upprättare. Tagit bort text: "För verifiering av sjukdomen rekommenderas dock biopsi."