

## Kontroll- och dokumentationsschema ök 3:or

### 9 – 10 år

Vid undersökning skall alltid 13:s och 23:s läge bestämmas. Detta skall dokumenteras i journal.

Palpera 13 och 23.

↓

13 och 23 palperas buccalt i normalt läge.

↘

Avvikande position på 2:orna (t.ex. distal- eller buccaltippning).

Ge akt på sidoskillnader!

13 och/eller 23 kan palperas buccalt i ett uttalat mesialt läge (bucc om 12,22)

13 och/eller 23 kan **ej** palperas buccalt

Fortsatt kontroll av 13 och 23:s eruption vid ord. rev-us.

Röntgen-bilder i 2 projektioner. Bedöm 3:ans läge och eruptionsriktning. Vid läge palatinalt om tandbågen eller uttalat mesial lutning kan primära hörntanden behöva extraheras i samråd med ortodontist.

Tandens eruption ska sedan följas av ansvarig tandläkare. Vid behov röntgenkontroll efter 6 månader och ev även senare).

Om riktning och läge ej normaliseras inom 12 månader ska ortodontist konsulteras

Vid osäkerhet skall alltid ortodontist konsulteras.

### 13 – 14 år

Bevaka att eruption sker/skett och gör nytt ställningstagande. Ge akt på persisterande **ej** mobila 53, 63.

53 och/eller 63 persisterar utan mobilitet

Röntgen-bilder i 2 projektioner. Lägesbestäm den permanenta hörntanden.

Vid ektopiskt läge 13 och/eller 23 konsultera ortodontist

### OBS!

Ange alltid i daganteckning att ställning tagits specifikt för 13,23 vid rev-us från 9-13 år.