

Parodontal operation

- ej regenerativ åtgärd

- Sköljning med klorhexidin, 2 mg/ml 2 gånger/dag under en hel minut.
- Ingen tandborstning eller approximal rengöring i operationsområdet innan suturerna avlägsnats.
- Icke opererade tänder borstas med tandkräm som inte innehåller natriumlaurylsulfat.

10-14 dagar efter operation

- Läkningskontroll och suturtagning
- Instruera/motivera i väl anpassade i approximala hjälpmedel.
- Komplettera med eventuellt en bindelsborste vid behov för att nå axiala vinklar palatinalt/lingualt.

Låt patienten träna själv!

- PTR- Professionell TandRengöring
- Kontrollera ocklusionen, traumatisk ocklusion kan uppstå efter operation.
- Mobila tänder kan behöva bettjusteras/fixeras.
- Behandla känsliga tandhalsar med lämpligt fluorlack.
- Postoperativ kontroll bör ske var 14:e dag fram till 3-månader efter operation.
- Fortsatt sköljning med klorhexidin, 2 mg/ml 2 gånger/dag, ytterligare 2 veckor.
- Därefter eventuell fortsatt sköljning efter individuella behov.

3 månader efter operation

- Infärgning, t.ex. TePe PlaqueSearch.
- Påvisa eventuella placktytor och instruera/motivera patienten till att upprätthålla en optimal munhygien.
- Kontrollera ocklusionen, traumatisk ocklusion kan uppstå efter operation.
- Mobila tänder kan behöva bettjusteras/fixeras.
- Avlägsna missfärgningar.
- Sätt in daglig sköljning med 0,2 % natriumfluoridlösning.
- Ingen fickmätning i operationsområden!

Låt patienten träna själv!

- PTR- Professionell TandRengöring
- Kontrollera ocklusionen, traumatisk ocklusion kan uppstå efter operation.
- Mobila tänder kan behöva bettjusteras/fixeras.
- Behandla känsliga tandhalsar med lämpligt fluorlack.

- Postoperativ kontroll bör ske var 14:e dag fram till 3-månader efter operation.
- Fortsatt sköljning med klorhexidin, 2 mg/ml 2 gånger/dag, ytterligare 2 veckor.
- Därefter eventuell fortsatt sköljning efter individuella behov.

3 månader efter operation

- Infärgning, t.ex. TePe PlaqueSearch.
- Påvisa eventuella plackytor och instruera/motivera patienten till att upprätthålla en optimal munhygien.
- Kontrollera ocklusionen, traumatisk ocklusion kan uppstå efter operation.
- Mobila tänder kan behöva bettjusteras/fixeras.
- Avlägsna missfärgningar.
- Sätt in daglig sköljning med 0,2 % natriumfluoridlösning.
- Ingen fickmätning i operationsområden!

6 och 9 månader efter operation

- Infärgning, t.ex. TePe PlaqueSearch.
- Påvisa eventuella plackytor och instruera/motivera patienten till att upprätthålla en optimal munhygien.
- Kontrollera ocklusionen, traumatisk ocklusion kan uppstå efter operation.
- Mobila tänder kan behöva bettjusteras/fixeras.
- Ingen fickmätning i operationsområden!

12 månader efter operation - utvärdering

- 1-års utvärdering sker vanligtvis på Specialisttandvården

Innefattar registrering av:

- Uppdatering hälsodeklaration.
- Kontroll av munslemhinnor.
- Plackregistrering (Viktig värdeområde för att motivera patienten med tanke på att denna patientgrupp är betydligt känsligare för plack än normalindivid).
- Nytt fullständigt fickstatus (Vi mäter 6 punkter, registrerar 4).
- BoP, blödning vid sondering.
- Pusförekomst.
- Furkationsinvolvering.
- Mobilitet.
- Röntgen, fyra stående bite-wing är standard, samt apikala röntgen på opererade tänder med regenerativ kirurgi. Övriga röntgen vid behov.
- Patient får träna på tandborstning med adekvata hjälpmedel.

Sjukdomsvärdering:

Sammanställning av aktuella data, utifrån dessa bedöms det framtida behandlingsbehovet.

