

Stelkrampsprofylax till barn vid sårskada

Remittera följande barn för akutspecialistbedömning:

- Alla barn under ett år, oavsett vaccinationsstatus
- Alla barn som inte följt barnvaccinationsprogrammet.

VACCINERAD MOT STELKRAMP?

Ja

FÅTT
1



Fått **en** dos stelkrampsvaccin (endast doser givna efter 2,5 månaders ålder räknas, annars betraktas barnet som ovaccinerat):

- Ge humant immunglobulin mot stelkramp, Tetagam, om det gått > 1 dygn sedan skadan, om skadan är mycket förorenad, eller om det inte går att excidera misstänkta föroreningar.
- Ge kombinationsvaccin dos 2 (se faktaruta).
- Säkerställ uppföljning med dos 3 via barnhälsovården eller elevhälsan. Tidpunkt för dos tre beror på ålder och tid sedan första dosen tetanusvaccin.

FÅTT
2



Fått **två** doser stelkrampsvaccin (endast doser givna efter 2,5 månaders ålder räknas):

- Ge kombinationsvaccin dos 3 (se faktaruta).
- Säkerställ uppföljning av barnvaccinationsprogrammet via barnhälsovården eller elevhälsan.

FÅTT
3



Fått **tre** doser stelkrampsvaccin, senaste dosen **för mer än fyra år sedan** (endast doser givna efter 2,5 månaders ålder räknas):

- Ge kombinationsvaccin dos 4 (se faktaruta).
- Säkerställ uppföljning av barnvaccinationsprogrammet via barnhälsovården eller elevhälsan.

FÅTT
4



Fått **fyra** doser stelkrampsvaccin, senaste dosen **för mer än tio år sedan** (endast doser givna efter 2,5 månaders ålder räknas):

- Ge kombinationsvaccin dos 5 (se faktaruta).
- Akutbedömning för vaccination ej nödvändig; vaccinkangesavprimärvård eller elevhälsan i samband med skadetillfället.
- Informera om behovet av påfyllnadsdos 20 år efter dos 5.

Nej

- Ge humant immunglobulin mot stelkramp, Tetagam, oavsett ålder och skadans utseende/tid efter skada.
- Ge kombinationsvaccin dos 1 (se faktaruta). Individuell bedömning för barn <6 v. ålder.
- Säkerställ uppföljning med vaccindos 2 efter 6–8 veckor via barnhälsovården eller elevhälsan.

Faktaruta

Rekommenderade kombinationsvacciner

Dos 1–3:

Sexvalent vaccin (fulldosvaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, hepatit B samt haemophilus influenzaetyp B), upphandlat i Region Gävleborg Hexyon).

Dos 4:

Tetravalent påfyllnadsvaccin (fulldosvaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio), upphandlat i Region Gävleborg är Tetravac.

Dos 5:

Boostervaccin av trivalent vaccin (difteri, stelkramp och kikhosta) med reducerad antigenhalt, upphandlat i Region Gävleborg är diTekiBooster.