

## Information om kikhosta till föräldrar med barn på förskola/skola

### Ett fall av kikhosta har diagnostiserats på ert barns förskola/skola.

Kikhosta är en luftvägsinfektion som ger hosta och ibland också feber. Hostan tilltar oftast under några veckor och kan ge kikningar. Barn över 1 år som vaccinerats mot kikhosta och vuxna brukar ha lindriga symtom, men är ändå smittsamma.

Barn som har kikhosta får vistas i förskola/skola eftersom smittan redan finns spridd i barngruppen då kikhosta konstateras.

### Vilka kan bli svårt sjuka?

För barn under 1 år och speciellt barn under 6 månader kan kikhosta vara en svår och besvärlig sjukdom. Detta gäller i synnerhet barn som ännu inte fått de två första vaccindoserna (innehåller kikhostevaccin) i barnvaccinationsprogrammet. Men även barn som fått två vaccindoser kan få en besvärlig sjukdom.

- När barn under 1 år utsatts för smitta med kikhosta ska man alltid kontakta sin hälsocentral för bedömning. Barn som är under 6 månader kan erbjudas förebyggande antibiotikabehandling så att de inte insjuknar i kikhosta.
- När barn mellan 6 månader-1 år får besvär som liknar kikhosta (hosta med eller utan kikningar och ev. snuva) kan antibiotikabehandling ges. Kontakta er hälsocentral för bedömning.
- Gravid kvinna som ska förlösas inom den närmaste tiden och har utsatts för smitta, ska kontakta sin hälsocentral för bedömning av behandling. Detta för att undvika smitta mellan mor och nyfött barn.

### Kontakt

Om ni som föräldrar har frågor är ni välkomna att i första hand kontakta er hälsocentral. Ta gärna med detta brev till hälsocentralen.

Ni kan också kontakta Smittskyddsenheten i Gävleborg, telefon 026-15 53 08 vid frågor.

Ingegerd Hökeberg

Bitr. Smittskyddsläkare  
Region Gävleborg

Reviderad 2017-11-08