

## **RSV-infektion**

### **Symtom**

Luftvägssymtom. Barn i förskoleåldern som får en RSV-infektion brukar uppvisa symtom som vid en allmän förkylning där snuva, feber och hosta dominerar. Eftersom man kan få en RSV-infektion mer än en gång så kan både förskolebarn, skolbarn och vuxna bli infekterade. För de allra minsta barnen kan en RSV-infektion vara farlig. Det infekterade späda barnet kan få en inflammation i luftvägarna som ger andningsbesvär – inflammationen kan bli så svår att sjukhusvård är nödvändig.

### **Orsak**

RS-virus (respiratory syncytial virus).

### **Inkubationstid**

Inkubationstiden är 3–5 dagar.

### **Smittvägar och smittspridning**

Sprids som en droppsmitta vid nysningar. Virus kan också spridas som en kontaktsmitta via händer eller föremål, såsom leksaker. Smittsamheten är stor.

### **Minska smittspridning**

Förskolebarn med späda syskon (särskilt de vars syskon är yngre än två månader) bör alltid tvätta händerna när de kommer hem från förskolan. Infektionen är vanligast efter influensasäsongen, dvs. i början på året.

### **Hur behandlas en RS infektion?**

Som andra virusinfektioner så får den läka ut med hjälp av kroppens eget försvar. Antibiotikabehandling kan ges om komplikationer tillstöter.

### **Ska den som är smittad eller sjuk stanna hemma?**

Allmäntillståndet får avgöra om barnet ska vara hemma.